

Criterios de Jones Revisados para la clasificación de la Fiebre Reumática

Gewitz et al. Revision of the Jones Criteria for the Diagnosis of Acute Rheumatic Fever in the Era of Doppler Echocardiography. *Circulation*. 2015;131:1818. DOI:10.1161/CIR.0000000000000205

A. Todos los pacientes que evidencien una infección pasada por SGA:			
<i>Diagnóstico</i>		<i>Criterios</i>	
FRA inicial		<ul style="list-style-type: none"> - 2 mayores - 1 mayor + 2 menores 	
FRA recurrente		<ul style="list-style-type: none"> - 2 mayores - 1 mayor y 2 menores - 3 menores 	
B. Criterios Mayores			
<i>Población con bajo riesgo</i>		<i>Población con riesgo moderado o alto</i>	
Carditis†	Clínica y/o subclínica	Carditis†	Clínica y/o subclínica
Artritis	Solo poliartritis	Artritis	<ul style="list-style-type: none"> - Monoartritis o poliartritis - Poliartralgias‡
Corea		Corea	
Eritema marginatum		Eritema marginatum	
Nódulos subcutáneos		Nódulos subcutáneos	
C. Criterios Menores			
<i>Población con bajo riesgo</i>		<i>Población con riesgo moderado o alto</i>	
Poliartralgia		Monoartralgia	
Fiebre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$		Fiebre $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$	
VSG ≥ 60 mm/1 ^a h y/o PCR ≥ 3 mg/dl§		VSG ≥ 60 mm/1 ^a h y/o PCR ≥ 3 mg/dl§	
Intervalo PR prolongado, teniendo encuestas los valores de referencia para cada edad (salvo que la carditis sea un criterio mayor)		Intervalo PR prolongado, teniendo encuestas los valores de referencia para cada edad (salvo que la carditis sea un criterio mayor)	

FRA: fiebre reumática aguda; PCR: proteína C reactiva; SGA: estreptococo del grupo A; VSG: velocidad de sedimentación glomerular

* Población de bajo riesgo es aquella con una incidencia de FRA ≤ 2 por 100.000 niños en edad escolar o con una prevalencia de enfermedad cardíaca reumática en toda la población ≤ 1 por 1.000 habitantes y año.

† Carditis subclínica se refiere a la valvulitis ecocardiográfica definida en la Tabla 3 del mismo artículo.

‡ La poliartralgia solo puede ser considerada un criterio mayor en la población con riesgo moderado o alto y tras haber excluido otras causas. Como en versiones anteriores de estos criterios, el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos no suelen estar presentes como los únicos criterios mayores. Además, las manifestaciones articulares solo pueden ser considerados como criterios mayores o menores, pero nunca como ambos en el mismo paciente.

§ El valor de la PCR debe ser mayor del límite de referencia del laboratorio local. Como el valor de la VSG varía durante el curso de la enfermedad, se debe valorar el valor pico de VSG.