

Criterios de clasificación de la artritis idiopática juvenil. Edmonton 2001

Petty RE, Southwood TR, Manners P et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. *J Rheumatol.* 2004;31:390-2.

Criterios de clasificación de la Artritis Idiopática Juvenil (AIJ)		
Artritis de inicio antes de los 16 años		
De más de 6 semanas de duración		
De causa desconocida (requiere excluir otras causas de artritis)		
Categorías de AIJ		
<i>Categoría</i>	<i>Criterios de inclusión</i>	<i>Criterios de exclusión</i>
AIJ sistémica	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis en 1 o más articulaciones precedida o con * Fiebre > 2 sem (documentada que es diaria durante al menos 3 días) y * ≥ 1 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Exantema evanescente - Adenomegalias - Hepato y/o esplenomegalia - Serositis 	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses
AIJ oligoarticular persistente	Artritis en ≤ 4 articulaciones durante todo el curso de la enfermedad	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses - AIJ sistémica en el paciente
AIJ oligoarticular extendida	Artritis en ≤ 4 articulaciones durante los primeros 6 meses con afectación de ≥ 5 articulaciones posteriormente	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses - AIJ sistémica en el paciente
AIJ poliarticular FR negativo	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis en ≥ 5 articulaciones en los primeros 6 meses * FR negativo 	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses - AIJ sistémica en el paciente

AIJ poliarticular FR positivo	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis en ≥ 5 articulaciones en los primeros 6 meses * FR de tipo IgM positivo en 2 o más ocasiones separadas al menos 3 meses durante los primeros 6 meses de enfermedad 	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - AIJ sistémica en paciente
Artritis psoriásica	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis + Psoriasis o * Artritis y al menos 2 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Dactilitis - Punteado ungueal u onicosis - Historia de psoriasis en familiar de 1^{er} grado 	<ul style="list-style-type: none"> - Artritis de inicio a partir de los 6 años en varón HLA-B27 positivo - EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter, uveítis anterior aguda en el paciente o en familiar de 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses - AIJ sistémica en el paciente
ARE	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis + Entesitis o * Artritis o entesitis y al menos 2 de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Dolor en SI y/o dolor lumbosacro de características inflamatorias - HLA-B27 positivo - Inicio de la artritis en varón ≥ 6 años - Uveítis anterior aguda (sintomática) - Antecedentes de EA, ARE, SI con EII, síndrome de Reiter o uveítis anterior aguda en familiar de 1^{er} grado 	<ul style="list-style-type: none"> - Psoriasis o historia de psoriasis en el paciente o en familiar 1^{er} grado - FR de tipo IgM positivo en 2 ocasiones separadas 3 meses - AIJ sistémica en el paciente
AIJ indiferenciada	<ul style="list-style-type: none"> * Artritis que: <ul style="list-style-type: none"> - No cumple criterios de ninguna categoría - Cumple criterios de más de una categoría 	

AIJ: artritis idiopática juvenil; EA: espondilitis anquilosante; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; ARE: artritis relacionada con entesitis; FR: factor reumatoide; HLA: antígeno leucocitario humano; SI: sacroileítis