

## **CO-14**

### **RESULTADOS DE EFICACIA Y SEGURIDAD DEL TRATAMIENTO CON ETANERCEPT A MEDIO PLAZO EN PACIENTES CON ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL POLIARTICULAR EN MENORES DE CUATRO AÑOS**

A. Marco, B. López, I. Calvo.

Hospital Universitario La Fe, Valencia

#### **Objetivos:**

La eficacia y seguridad de ETN ha sido comprobada en pacientes con Artritis Idiopática Juvenil (AIJ), aunque en menor número en lo que se refiere a la población menor de 4 años. Por ello el objetivo de este estudio, es comprobar la eficacia y seguridad de ETN en un grupo de 21 pacientes menores de 4 años con AIJ forma Poliarticular, con un seguimiento medio de 32 meses y valorar retrospectivamente la discontinuidad conseguida del fármaco en dicha población.

#### **Método:**

Se recogieron las siguientes variables: datos epidemiológicos, número de articulaciones activas y limitadas al inicio del tratamiento y a los 6 meses; parámetros analíticos incluyendo PCR, VSG, hierro y hemoglobina al inicio, a los 3 y a los 6 meses de tratamiento. Asimismo se valoraron parámetros de eficacia como CHAQ, EVA médico y de los padres al inicio y a los 6 meses. Se realizó en todos consentimiento informado.

#### **Resultados:**

Se estudió un total de 21 pacientes (14 niñas y 7 niños), con edad media al diagnóstico de 20 meses. Todos los pacientes recibieron metotrexato, corticoides y etanercept. El tiempo medio de tratamiento con etanercept fue de 32 meses con un máximo de 73 meses. En todos los pacientes se alcanzó remisión con tratamiento; Todos los pacientes consiguieron suspender corticoides e el 60% MTX. Se discontinuo ETN solo en 2 pacientes por remisión: uno de ellos precisó reiniciarlo por brote 3 meses después y el otro continúa en remisión sin tratamiento un año después. 4 pacientes llevan dosis menores de mantenimiento. Ninguno presentó efectos adversos graves secundarios a la medicación.

#### **Conclusión:**

Definimos por lo tanto un grupo de pacientes con características específicas: mayor afectación articular y analítica; alto porcentaje de remisión con tratamiento biológico sin secuelas de la enfermedad a medio plazo y buen perfil de seguridad en tratamiento biológico con etanercept. Estos resultados y de otros autores apoyarían la indicación de etanercept en este rango de edad.