

**P-21**

**SÍNDROME DE EDEMA TRANSITORIO DE MEDULA ÓSEA - UN DIAGNOSTICO DIFERENCIAL POCO FRECUENTE DEL NIÑO CON COJERA**

J. Ramakers, L. Picó Fuster.

Hospital Son Llätzer, Palma de Mallorca

**Introducción:**

El Síndrome de Edema Transitorio de Medula Ósea (SETMO) es una patología bien descrita en adultos. Se presenta con dolor articular y/o óseo y recuperación completa a lo largo de meses. Apenas existen casos descritos de SETMO en niños.

**Caso Clínico:**

Varón de 5 años, visto desde los 3 años en varios centros por cojera intermitente en extremidad izquierda sin trauma previo.

Al debut, analítica sanguínea, ecografía de caderas y radiografías de pies y caderas resultan normales. Posteriormente la gammagrafía ósea muestra hipervascularización en tarso izquierdo y la RNM presenta patrón de edema óseo en calcáneo con posible microfractura. Remite con AINES a lo largo de 6 meses.

Por nuevo episodio de cojera izquierda a los 5 años, se realiza RNM de control que demuestra un patrón de edema de medula ósea en hueso navicular y tercera cuña y normalización completa de las alteraciones descritas en la RNM anterior.

**Discusión:**

La evolución y la RNMs del paciente son compatibles con el diagnóstico de SETMO con carácter migratorio.

No podemos descartar que el primer episodio de edema de medula ósea se debiese exclusivamente a la microfractura y de que se tratase de dos episodios independientes.

Dentro de las diferentes hipótesis con respecto a la causa de SETMO también se discute que este puede ser un tipo de osteonecrosis abortado en una fase inicial, pudiendo explicar la microfractura.

**Conclusion:**

El SETMO es una entidad poco frecuente que hay que considerar en el diagnóstico diferencial de la cojera en niños ante un curso prolongado o intermitente. Debido a su carácter benigno, su diagnóstico evitaría pruebas innecesarias.