

Tabla. Criterios de clasificación de las espondiloartritis del ESSG (*European Spondylarthropathy Study Group*) y del grupo ASAS (*Ankylosing Spondylitis Assessment Study*)

Criterios de clasificación de espondiloartritis del <i>European Spondylarthropathy Study Group</i>	
Dolor en columna vertebral de características inflamatorias o sinovitis, asimétrica o de predominio en extremidades inferiores, y ≥ 1 de los siguientes criterios:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Historia familiar de espondiloartritis, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal 2. Psoriasis 3. Enfermedad inflamatoria intestinal 4. Uretritis, cervicitis o diarrea aguda en el mes previo al inicio de la artritis 5. Dolor alternante en glúteos 6. Entesopatía 7. Sacroileítis radiológica 	
Criterios de clasificación de espondiloartritis del <i>Ankylosing Spondylitis Assessment Study</i>	
Espondiloartritis axiales*	Espondiloartritis periféricas
<p>Pacientes con dolor lumbar < 3 meses de duración y edad de inicio < 45 años</p> <p>A. Criterios clínicos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumbalgia inflamatoria** 2. Artritis periférica 3. Entesitis 4. Dactilitis 5. Buena respuesta a AINEs 6. Antecedentes familiares de espondiloartritis, psoriasis, uveítis, ARE, EII 7. Uveítis anterior 8. Psoriasis 9. Enfermedad inflamatoria intestinal 10. HLA-B27 positivo 11. Aumento de PCR en presencia de dolor lumbar y tras exclusión de otras causas <p>B. Sacroileítis en imagen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sacroileítis radiológica definitiva según los criterios modificados de New York o inflamación aguda en RM sugestiva de sacroileítis <p>Predisposición genética (HLA-B27 positivo)</p>	<p>Artritis, entesitis o dactilitis (criterio necesario) y:</p> <p>≥ 1 de los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uretritis/cervicitis o diarrea aguda en el mes previo 2. Sacroileítis (radiológica o por RM) 3. Uveítis 4. Psoriasis 5. Enfermedad inflamatoria intestinal 6. HLA-B27 <p>O, alternativamente, ≥ 2 de los siguientes criterios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Artritis 2. Entesitis 3. Dactilitis 4. Dolor lumbar inflamatorio 5. Antecedentes familiares de espondiloartritis

*Se clasifican como espondiloartritis axial si se cumple el criterio de imagen + 1 criterio clínico o la predisposición genética + 2 criterios clínicos; **si cumple ≥ 4 de los siguientes: 1) edad de inicio < 40 años; 2) inicio insidioso; 3) mejoría con el ejercicio; 4) no mejoría con reposo; 5) dolor nocturno (con mejoría tras levantarse); AINEs: antiinflamatorios no esteroideos; Are: artritis reactiva; EII: enfermedad inflamatoria intestinal; PCR: proteína C reactiva; RM: resonancia magnética

Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, et al. The European Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. *Arthritis Rheum* 1991; 34: 1218-27

Prieur AM, Lustrat V, Dougados M. Criteres de classification des spondyloarthropathies chez les enfants. [Spondyloarthropathies classification criteria in children]. *Arch Franc Ped* 1993, 50:379-85

Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, et al. The development of Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for axial spondyloarthritis (part II): validation and final selection. *Ann Rheum Dis* 2009, 68(6):777-783.

Rudwaleit M, van der Heijde D, Landewe R, et al. The Assessment of SpondyloArthritis International Society classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. *Ann Rheum Dis* 2011, 70(1):25-31.