

ÍNDICE DE DAÑO ARTICULAR EN ARTRITIS JUVENIL (JADI-A)

Articulación	Definición del daño articular	Puntuación	
Temporomandibular	Micrognatia o asimetría facial que produce un compromiso estético importante y/o mal oclusión dental	1	
	Restricción severa de apertura bucal (no se pueden introducir 3 dedos superpuestos)	2	
Columna cervical	Extensión <50% del rango normal o subluxación demostrada radiológicamente	1	
	Anquilosis o historia de compresión medular o fusión quirúrgica	2	
		Derecha	Izquierda
Hombro	Rotación externa <50% del rango normal y/o abducción <180º	1	1
	Anquilosis o prótesis	2	2
Codo	Contractura en flexión <30º	1	1
	Contractura en flexión >30º, anquilosis o prótesis	2	2
Carpó	Extensión o flexión <50% del rango normal o subluxación cubital o radial, o desviación cubital o radial	1	1
	Anquilosis o prótesis	2	2
MCF	Contractura en flexión, desviación cubital o radial=1 I	1 2	1 2
	Subluxación, anquilosis o prótesis=2 II	1 2	1 2
	III	1 2	1 2
	IV	1 2	1 2
	V	1 2	1 2
IFP	Contractura en flexión =1 I	1 2	1 2
	Cuello de cisne, boutonniere o anquilosis=2 II	1 2	1 2
	III	1 2	1 2
	IV	1 2	1 2
	V	1 2	1 2
Cadera	Rotación interna <10º	1	1
	Anquilosis o prótesis	2	2
Rodilla	Desviación en valgo >15º debido a artritis o contractura en flexión <25º	1	1
	Contractura en flexión >25º ó prótesis	2	2
Tobillo	Deformidad en valgo fija <20º	1	1
	Deformidad en valgo fija >20º, anquilosis, artrodesis o prótesis	2	2
MTF	Deformidad visible debida a artritis	1	1
	Artroplastia de región anterior del pie	2	2
	Puntuación total (máx 72)		

Las contracturas y otras deformidades articulares sólo deben puntuarse si se deben a daño previo y no a artritis activa y están presentes al menos 6 meses. Para cada articulación, sólo se puntúa la lesión más severa. Las articulaciones temporomandibulares (derecha e izquierda), las articulaciones del tobillo, tarso y MTF de cada pie son consideradas como una unidad.

El daño sólo se puntúa si está presente.