

ÍNDICE DE DAÑO EXTRAARTICULAR EN ARTRITIS JUVENIL (JADI-E)

Ítem	Ausente	Presente
OCULAR		
Catarata y/ó otras complicaciones derivadas de uveítis	0	1 2 3
con pérdida de visión	0	1 2 3
Puntos: -2 si cx ocular -3 si ceguera		
MUSCULOESQUELÉTICO (NO ARTICULAR)		
Atrofia muscular severa	0	1
Osteoporosis con fracturas o colapsos vertebrales	0	1
Necrosis avascular ósea	0	1
Alteración de la alineación vertebral significativa debido a disimetría de MMII o contractura de cadera	0	1
Dismetría significativa de MMII o alteración del crecimiento local en algún segmento	0	1
CUTÁNEO		
Estrías	0	1
Atrofia subcutánea secundaria a infiltración con corticoides	0	1
ENDOCRINO		
Fallo del crecimiento	0	1
Retraso puberal	0	1
Diabetes mellitus	0	1
AMILOIDOSIS SECUNDARIA	0	1
Puntuación total (máx 17)		

El daño se define como cambios persistentes de la anatomía, fisiología, patología o función que pueden ocurrir desde la presentación de la enfermedad, como consecuencia de la actividad de la enfermedad o su tratamiento y que están presentes al menos durante 6 meses. La misma lesión no puede puntuarse 2 veces.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Catarata: opacidad debida a corticoterapia o uveítis documentada por oftalmoscopio.

Complicaciones oculares diferentes a uveítis o cataratas: sinequias, queratopatía en banda o glaucoma, documentada por oftalmólogo, que resulte en una pérdida de visión de al menos 1/10.

Atrofia muscular: disminución de la masa muscular demostrada en examen clínico.

Osteoporosis con fracturas o colapso vertebral: demostrado por cualquier técnica de imagen.

Necrosis avascular: demostrado por cualquier técnica de imagen.

Alteración de la alineación vertebral significativa debido a disimetría de MMII o contractura de cadera: escoliosis vertebral demostrada en exploración clínica o por técnica de imagen.

Dismetría significativa de MMII o alteración del crecimiento local en algún segmento: disimetría de al menos 1 cm o alteración del crecimiento (sobrecrecimiento) de algún segmento óseo debido a artritis demostrado radiológicamente.

Estrías: estrías rojo vinosas secundarias a corticoterapia.

Atrofia subcutánea secundaria a infiltración por corticoides: atrofia subcutánea persistente y significativa en lugar en el que se realizó infiltración previamente.

Fallo del crecimiento: definido como al menos 2 de los siguientes 3 hallazgos:

-Peso inferior al percentil 3 para edad.

-Velocidad de crecimiento en 6 meses inferior al percentil 3 para la edad.

-Cruce de 2 centiles en la curva de crecimiento (5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 90%).

Retraso puberal: retraso en la aparición de los caracteres sexuales secundarios mayor de 2 desviaciones estándar para la edad según estadio de Tanner.

Diabetes mellitus: que requiera tratamiento.

Amilodosis secundaria: confirmada por tinción con Rojo Congo.